



## 2-Propanol 70% (V/V) Lösung zur Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor Injektionen, für Kühlumschläge

- » parfümfrei
- » begrenzt viruzid, bakterizid, levurozid, tuberkulozid

VAH RKI

### Gebrauchsinformation

**Darreichungsform:** Lösung.

**Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut und zur  
Bereitung von Umschlägen.

**Stoff- oder Indikationsgruppe:** Desinfektionsmittel

**Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische  
Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen  
und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor  
Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion  
talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

**Gegenanzeigen:** sanocid ist nicht zur Desinfektion offener  
Wunden geeignet.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:** Keine bekannt.

**Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und  
leichtes Brennen auftreten.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen  
bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies  
gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind.  
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut  
für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz,  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de)  
anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu  
beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses  
Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirksamer  
Bestandteil: 63,1 g 2-Propanol; sonstiger Bestandteil:  
gereinigtes Wasser.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Zur Desinfektion  
vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird  
die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 30 Sekunden  
lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion  
werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben  
und 5 Minuten\* lang feucht gehalten (\*gem. VAH wurde eine  
Einwirkzeit von 2 Minuten bestätigt). Zur Desinfektion vor  
einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird  
die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden  
lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor  
Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig  
abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion  
von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung  
sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.  
Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser  
verdünnt anzuwenden.

**Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je  
nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut,  
Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die  
Einwirkzeiten zu verlängern. sanocid wirkt nicht sporenabtötend  
und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und  
Spritzen nicht geeignet. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter  
aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

**Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten!  
Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind  
unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu  
treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der  
verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das  
Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nach  
Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: 10/2025

Zul.-Nr.: 1599.98.99

Verfügbare Gebindegrößen	REF	PZN	Stück / Karton	Stück / Palette
250 ml Pumpflasche	4010025	06920517	30 Flaschen	1.500 Flaschen

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.